

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

70  
DLP -7-9-64 33684

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE STRASBOURG (Tél. 34-14-63

ABONNEMENT ANNUEL

Poste 93)

15 F.

(BAS-RHIN, HAUT-RHIN, MEURTHE-ET-MOSELLE, MOSELLE, VOSGES)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux : Cité Administrative, 2, Rue de l'Hôpital Militaire  
STRASBOURG

C. C. P. : STRASBOURG 55-08-86

31 Août 1964

Supplément n° 2 du Bulletin du mois d'Août 1964

## Information

### ARBRES FRUITIERS.

#### TAVELURES ET MALADIES DE CONSERVATION

Certaines maladies de conservation peuvent être évitées en réalisant un traitement fongicide avant la récolte avec l'un des produits généralement utilisés pour la lutte contre les Tavelures. Nous conseillons d'effectuer un traitement sur l'ensemble des plantations de pommiers et de poiriers quinze jours avant la récolte.

De plus, ce traitement permettra d'enrayer les attaques tardives de Tavelure pouvant apparaître en fin de saison.

#### GRANDE CULTURE

##### - HOUBLON -

#### MILDIOU

Un dernier traitement devra être réalisé dans les plantations où la récolte est prévue après le 6 Septembre.

#### POMMES DE TERRE

#### MILDIOU

Les dernières précipitations furent trop faibles pour permettre une extension du Mildiou de la pomme de terre et cette maladie ne se manifeste actuellement que par des taches très isolées. Un retour de conditions favorables au développement de ce champignon pouvant intervenir avant la récolte des variétés tardives et notamment dans les régions montagneuses, nous rappelons que le seul traitement à envisager serait la destruction chimique des fanes, afin d'éviter les contaminations sur tubercules (notre note, supplément n° 1 du Bulletin du mois d'Août 1964).

.../...

203

CULTURES MARAICHÈRES

TEIGNE DU POIREAU

De nouvelles attaques de Teigne du poireau sont observées actuellement. Prévoir un nouveau traitement dans les cultures où ce parasite est présent tout en tenant compte des délais d'emploi de l'insecticide choisi. On peut utiliser le D.D.T. émulsion, le Parathion éthyle, le Parathion méthyle, le Diazinon ou le Malathion.

PIERIDE DU CHOU

Des dégâts de Piéride du chou sont signalés dans divers secteurs. Les produits à base de D.D.T., Toxaphène, Roténone, Malathion, Parathion, permettent de les détruire efficacement. Si l'on opère en pulvérisation, avoir soin d'ajouter un bon mouillant à la bouillie.

VERS GRIS

Ces Chenilles de noctuelles sont très actives dans de nombreuses cultures. Intervenir si nécessaire, par l'épandage entre les lignes, d'un appât préparé sur les bases suivantes :

- pour 10 kg de son, utiliser 20 grs. de M.A. de Dieldrine, d'Aldrine ou de Chlorthiepin ou 30 grs. M.A. d'Heptachlore ou de Chlordane, que l'on mélangera avec 3 à 4 litres d'eau. Arroser le son avec cette solution tout en assurant un bon brassage du mélange.

REMARQUE

Il existe dans le commerce des granulés prêts à l'emploi.

Les Contrôleurs :  
J. BERNARD et C. GACHON.

l'Inspecteur :  
J. HARRANGER.

Imprimerie de la Station de STRASBOURG/Directeur-Gérant : L. BOUYX.